

【No.8】 weekly HER + PTX療法

病名 _____ 外来開始日 _____ 年 月 日 治療開始日 _____ 年 月 日
 変更日 ① _____ 年 月 日 変更日 ② _____ 年 月 日
 _____ 科 ID _____ 氏名 _____
 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 主治医 _____ 指示医 _____ 確認医(科長) _____
 PS 0・1・2・3・4 HBs抗原(+)→HBV DNA(), HBs抗原(-)→HBc抗体()HBs抗体()

指 示 内 容

① ○ポート患者
 生食20mlシリンジ(穿刺)・250mlでルート確保後、ロック
 ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック

② {グラニセトロンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A}
 +デキサート _____ mg+ポララミン _____ A
 +{ファモチジン _____ A or プロイメント[®]150mg} (30min)
 ※トラスツズマブ単独の場合、②は投与しない。

※ プロイメントを使用する場合 使用後「生食50ml全開」を行い次の投与に移ること。

③ 生食250ml+パクリタキセル _____ mg
 (100mg _____ V, 30mg _____ V) (80mg/m²) (60min)
 (インラインフィルタ使用)

催吐リスク:軽度
(10~30%)

④ 初回
 生食250ml+注射用水20ml 2V+トラスツズマブ _____ mg
 (4mg/kg) (90・60・30min) (150mg _____ V, 60mg _____ V)

催吐リスク:最小
(<10%)

2回目以降
 生食250ml+注射用水20ml 2V+トラスツズマブ _____ mg
 (2mg/kg) (90・60・30min) (150mg _____ V, 60mg _____ V)

※注射用水はトラスツズマブ溶解用

⑤ ①の残液でフラッシュ

⑥ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック
 (CVポートのみ)

HER:毎週 PTX:毎週 or 3投1休