

【No.39】 DTX + CBDCA 療法

病名 _____ 外来開始日 _____ 年 月 日 治療開始日 _____ 年 月 日
 変更日 ① _____ 年 月 日 変更日 ② _____ 年 月 日
 _____ 科 ID _____ 氏名 _____
 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 主治医 _____ 指示医 _____ 確認医(科長) _____
 PS 0・1・2・3・4 HBs抗原(+)→HBV DNA(), HBs抗原(-)→HBc抗体() HBs抗体()

指 示 内 容

- ① ○ポート患者
 生食20mlシリンジ(穿刺)・250mlでルート確保後、ロック
 ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック



- ② {グラニセトロンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A}
 +デキサート _____ mg +ポララミン _____ A
 + {ファモチジン _____ A or プロイメント150mg} (30min)



※ プロイメントを使用する場合 使用後「生食50ml全開」を行い次の投与に移ること。

- ③ 生食250ml+ドセタキセル _____ mg
 (80mg _____ V, 20mg _____ V) (60min)

**嘔吐リスク:軽度
(10~30%)**



ドセタキセル
60mg~70mg/m²

- ④ 生食250ml+カルボプラチン _____ mg
 (450mg _____ V, 150mg _____ V, 50mg _____ V)
 (60min)

**嘔吐リスク:中等度
(30~90%)**



カルボプラチン
投与量
Auc 5~6
×
(実測Ccr+25)

- ⑤ ①の残液でフラッシュ

- ⑥ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック
 (CVポートのみ)

1投2休