

# 【No.47】 R-DeVIC療法(悪性リンパ腫)

病名 \_\_\_\_\_

外来開始日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

治療開始日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

変更日 ① \_\_\_\_\_ 年 月 日

変更日 ② \_\_\_\_\_ 年 月 日

\_\_\_\_\_ 科

ID \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_ ( 才)

身長 \_\_\_\_\_ cm

体重 \_\_\_\_\_ kg

体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

主治医 \_\_\_\_\_

指示医 \_\_\_\_\_

確認医(科長) \_\_\_\_\_

PS 0・1・2・3・4

HBs抗原(+)→HBV DNA( )、HBs抗原(-)→HBc抗体( )HBs抗体( )

指示内容	月日	D1	2	3	4	5	6	7
		曜日						
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺)・250mlでルート確保 ○末梢患者 生食250mlでルート確保	指示	●	●	●	●			
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
② グラニセトロンバッグ100ml +デキサート6.6mg5V (30min)	指示		●	●	●			
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
③ 生食500ml+リツキシマブ _____mg (500mg _____V,100mg _____V) 点滴静注 ※リツキシマブ点滴速度参照	指示	●						
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
④ 5%glu250ml+カルボプラチン _____mg (450mg _____V,150mg _____V,50mg _____V)(300mg/m <sup>2</sup> ) (60min)	指示		●					
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
⑤ 5%glu500ml+ペプシド _____mg (100mg _____V) (100mg/m <sup>2</sup> ) (120min)	指示		●	●	●			
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
⑥ 生食500ml+イホマイド _____mg (1,000mg _____V) (1,500mg/m <sup>2</sup> ) (120min)	指示		●	●	●			
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
⑦ 生食100ml+ウロミテキサン _____mg (400mg _____V)(300mg/m <sup>2</sup> ) (30min)	指示		●	●	●	●	●	●
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
⑧ ①の残液でフラッシュ	指示	●	●	●	●			
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
⑨ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック (CVポートのみ)	指示	●	●	●	●			
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							
day1 前投薬(点滴開始30分前) カロナール錠(200) 2T,レスタミンコーワ錠(10) 3T 内服	指示	●						
	受領							
	入力							
	実施							
	実施							

※リツキシマブ点滴速度  
初回は①~③  
2回目以降②,③で投与  
① 25 ml/hr (60min)  
② 100 ml/hr (60min)  
③ 200 ml/hr (終了まで)

リツキシマブ 375 mg/m<sup>2</sup>

カルボプラチン 300 mg/m<sup>2</sup>

ペプシド 100 mg/m<sup>2</sup>

イホマイド 1,500 mg/m<sup>2</sup>

ウロミテキサン 300 mg/m<sup>2</sup>

3W1コース ※⑦は、⑥投与の15分前、4時間後、8時間後に投与