

【No.61】 コホリン療法

病名 _____ 外来開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 治療開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
変更日 ① _____ 年 _____ 月 _____ 日 変更日 ② _____ 年 _____ 月 _____ 日
_____ 科 ID _____ 氏名 _____
身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
主治医 _____ 指示医 _____ 確認医(科長) _____
PS 0・1・2・3・4 HBs抗原(+)→HBV DNA(), HBs抗原(-)→HBc抗体() HBs抗体()

指 示 内 容

- ① ○ポート患者
生食20mlシリンジ(穿刺)・250mlでルート確保後、ロック
○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック



- ② {グラニセトロンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A}
+デキサート _____ mg+ポララミン _____ A
+ {ファモチジン _____ A or プロイメント150mg} (30min)



※ プロイメントを使用する場合 使用後「生食50ml全開」を行い次の投与に移ること。

- ③ 生食100ml+コホリン _____ mg
(7.5mg _____ V)(4~5mg/m²)(60min)

**催吐リスク:軽度
(10~30%)**



- ④ 生食1,000ml(240min)

- ⑤ 生食20ml シリンジロック or ヘパリンシリンジロック
(ポート患者のみ)