

# 【No.92】 AMR 療法

病名 \_\_\_\_\_

外来開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

治療開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

\_\_\_\_\_ 科

変更日 ① \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

変更日 ② \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

身長 \_\_\_\_\_ cm

ID \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_才)

主治医 \_\_\_\_\_

体重 \_\_\_\_\_ kg

体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

PS 0・1・2・3・4

指示医 \_\_\_\_\_

確認医(科長) \_\_\_\_\_

HBs抗原(+)→HBV DNA(\_\_\_\_), HBs抗原(-)→HBc抗体(\_\_\_\_) HBs抗体(\_\_\_\_)

指 示 内 容		D1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	月日															
	曜日															
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺)・250mlでルート確保後、ロック ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック 	指示	●	●	●												
	受領															
	入力															
	実施															
② {グラニセトロンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A} +デキサート____mg+ポララミン__A +ファモチジン__A (30min) 	指示	●	●	●												
	受領															
	入力															
	実施															
③ ①の残液でフラッシュ	指示	●	●	●												
	受領															
	入力															
	実施															
④ 生食50ml+カルセド____mg (20mg____V、50mg____V)  点滴静注 全開	指示	●	●	●												
	受領															
	入力															
	実施															
⑤ ①の残液でフラッシュ	指示	●	●	●												
	受領															
	入力															
	実施															
⑥ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック (CVポートのみ)	指示	●	●	●												
	受領															
	入力															
	実施															
カルセド 45mg/m <sup>2</sup> /日 D1、2、3 (1投2休 ____ コース)																