

【No.95】 PTX/CBDCA療法(分割投与)

病名 _____

外来開始日 _____ 年 月 日

治療開始日 _____ 年 月 日

_____ 科

変更日 ① _____ 年 月 日

変更日 ② _____ 年 月 日

身長 _____ cm

ID _____

氏名 _____ (____才)

主治医 _____

体重 _____ kg






体表面積 _____ m²

PS 0・1・2・3・4

指示医 _____

確認医(科長) _____

HBs抗原(+)→HBV DNA()、HBs抗原(-)→HBc抗体()、HBs抗体()

指示内容	D1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
																													月日
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺) ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック 	指示	●						●							●														
	受領																												
	入力																												
	実施																												
②-1 {グラニセトンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A} +デキサート _____ mg+ポララミン _____ A +{ファモチジン _____ A or プロイメンド150mg} (30min) 1週目 ※ プロイメンド使用する場合 使用後「生食50ml全開」を投与 	指示	●																											
	受領																												
	入力																												
	実施																												
②-2 {グラニセトンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A} +デキサート _____ mg+ポララミン _____ A +{ファモチジン _____ A or プロイメンド150mg} (30min) 2,3週目 ※ プロイメンド使用する場合 使用後「生食50ml全開」を投与 	指示							●							●														
	受領																												
	入力																												
	実施																												
③ 5%Glu 250ml + パクリタキセル _____ mg ※インラインフィルターを使用 (100mg __V,30mg __V)(70mg/m ²) (60min) 	指示	●						●							●														
	受領																												
	入力																												
	実施																												
④ 5%Glu 250ml + カルボプラチン _____ mg (450mg __V,150mg __V,50mg __V)(AUC6) (60min) 	指示	●																											
	受領																												
	入力																												
	実施																												
⑤ ①の残液でフラッシュ	指示	●						●							●														
	受領																												
	入力																												
	実施																												
⑥ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック (CVポートのみ)	指示	●						●							●														
	受領																												
	入力																												
	実施																												

3投1休