

【No.100】 CBDCA/S-1療法

病名 _____ 外来開始日 _____ 年 月 日 治療開始日 _____ 年 月 日
 変更日 ① _____ 年 月 日 変更日 ② _____ 年 月 日
 _____ 科 ID _____ 氏名 _____ (才)
 身長 _____ cm 体重 _____ kg 体表面積 _____ m²
 主治医 _____ 指示医 _____ 確認医(科長) _____
 PS 0・1・2・3・4 HBs抗原(+)→HBV DNA(), HBs抗原(-)→HBc抗体() HBs抗体()

指示内容		D1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		月日																					
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺) 生食250mlでルート確保後、ロック ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
② {グラニセトロンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A} +デキサート _____mg+ポララミン _____A +{ファモチジン _____A or プロイメント [®] 150mg} (30min) ※ プロイメント [®] を使用する場合 使用後「生食50ml全開」を投与	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
③ 5%glu250ml+カルボプラチン _____mg (450mg _____V, 150mg _____V, 50mg _____V) (60min) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> カルボプラチン AUC=5 </div>	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
④ ①の残液でフラッシュ	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
⑤ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック (CVポートのみ)	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
S-1 1.25m ² 未満 :80mg 1.25以上1.5m ² 未満:100mg D1-14 1.5m ² 以上 :120mg	指示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
	受領																						
	入力																						
	実施																						
S-1 D1~14(2週投与・1週休薬), カルボプラチン D1投与, 1投2休(____コース) S-1の内服管理は各科で行うこと																							