

【No.141】 DXR/CDDP療法

病名 _____

外来開始日 _____ 年 月 日

治療開始日 _____ 年 月 日

_____ 科

変更日 ① _____ 年 月 日

変更日 ② _____ 年 月 日

身長 _____ cm

ID _____

氏名 _____ (才)

主治医 _____

体重 _____ kg

体表面積 _____ m²

PS 0・1・2・3・4

指示医 _____

確認医(科長) _____

HBs抗原(+)→HBV DNA()、HBs抗原(-)→HBc抗体()、HBs抗体()

指示内容		D1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		月日																					
		曜日																					
① ○ポート患者 生食20mlシリンジ(穿刺) 生食250mlでルート確保後、ロック ○末梢患者 生食250mlでルート確保後、ロック	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
② ラクテック 500ml (120min) ③ ソリタT3 500ml (120min)	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
④ {グラニセトロンバッグ100ml or 生食100ml+アロキシ(0.75) 1 A} +デキサート _____ mg +ポララミン 1A + [ファモチジン1A or プロイメンド1A] (30min) ※プロイメンド使用の場合、終了後「生食50ml 全開」を追加。	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
⑤ 生食 50ml + アドリアシン _____ mg (50mg __V, 10mg __V) (60mg/m ²) (全開) ※終了後、①の残液でフラッシュ	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
⑥ 生食 500ml + シスプラチン _____ mg (50mg __V, 25mg __V, 10mg __V) (50mg/m ²) (180min) ※終了後、①の残液でフラッシュ。	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						
⑦ ソリタT3 500ml + プリンペラン 2A (90min) ⑧ ソリタT3 500ml (90min) ×3回 ⑨ 生食20mlシリンジロック or ヘパリンシリンジロック (CVポートのみ)	指示	●																					
	受領																						
	入力																						
	実施																						

3週毎 (1投2休)